傅青主女科

序

青主先生於明季時以諸生伏闕上書訟袁臨侯冤事尋得白當時義聲動天下馬文甬義士傳比之裴瑜魏邵國變後隱居崛嵋山中四方仰望丰采己未鴻詞之薦先生堅卧不赴有司敦促就道先生卒守介節

聖祖仁皇帝鑒其誠降

旨傅山文學素著念其年邁從優加銜以示恩榮遂授內閣中書聽其回籍蓋其高尚之志已久爲

聖天子所心重矣而世之稱者乃盛傳其字學與醫術不已細哉字爲六藝之一先生固嘗究心若醫者先生所以晦迹而逃名者也而名即隨之抑可奇矣且夫醫亦何可易言自後漢張仲景樹立方書以來幾二千年專門

名家罕有窺其奥者先生以餘事及之遽通乎神余讀
兼濟堂文集並觚賸諸書記先生軼事其診疾也微而
臧其用方也奇而法有非東垣丹溪諸人所能及者昔
人稱張仲景有神思而乏高韻故以方術名先生既擅
高韻又饒精思賢者不可測如是耶向聞先生有手著
女科並産後書二冊未之見也近得鈔本於友人處乙
酉適世兄王奎章來省試具道李子緝中賢至丙戌冬
果齎貲命付剞劂甚盛德事也故樂爲序而行之並述
先生生平大節及
聖朝虞大之典不禁爲之掩卷而三歎也道光丁亥夏五月

丹崖張鳳翔題

序

執成方而治病古今之大患也昔人云用古方治今病如拆舊屋蓋新房不經大匠之手經營如何得宜誠哉是言昔張仲景先生作傷寒論立一百一十三方言後世必有執其方以誤人者甚矣成方之不可執也然則今之女科一書何爲而刻乎此書爲傅青主徵君手著其居心與仲景同而立方與仲景異何言之仲景傷寒論雜症也有五運六氣之殊有中表傳裏之異或太陽太陰不一其稟或內傷外感不一其原或陽極似陰陰極似陽不一其狀非精心辨症因病製方斷不能易危就安應手即愈此書則不然其方專爲女科而設其症則爲婦女所同帶下血崩調經種子以及胎前產後人

雖有虛實寒熱之分而方則極平易精詳之至故用之當時而效傳之後世而無不效非若傷寒雜病必待臨症詳審化裁通變始無貽誤也嘗慨後世方書汗牛充棟然或偏攻偏補專於一家主熱主寒堅執謬論炫一己之才華失古人之精奧仲景而後求其貫徹靈素能收十全之效者不數數覯讀徽君此書談症不落古人窠臼制方不失古人準繩用藥純和無一峻品辨症詳明一目了然病重者十劑奏功病淺者數服立愈較仲景之傷寒論方雖不同而濟世之功則一也此書晉省鈔本甚夥然多秘而不傳間有減去藥味錯亂分量者彼此參證多不相符茲不揣冒昧詳校而重刊之竊願家置一編遇症翻檢照方煎服必能立起沉痾並登壽

域或亦濟人利世之一端也夫

道光十一年新正上元同里後學祁爾誠謹序

女科上卷目錄 共三十八條三十九症四十一方

下部冰冷不受孕溫胞飲
胸滿少食不受孕溫土毓麟湯
少腹急迫不受孕寬帶湯
嫉妬不受孕開鬱種玉湯
肥胖不受孕加味補中益氣湯
骨蒸夜熱不受孕清骨滋腎湯
腰酸腹脹不受孕升帶湯
便澁腹脹足浮腫不受孕化水種子湯

婦科一門最屬難治不難於用方難於辨症也五帶症辨之極明立方極善倘用之不效者必其人經水

女科上卷

陽曲傅　山青主手著

白帶下一

夫帶下俱是濕症而以帶名者因帶脈不能約束而有此病故以名之蓋帶脈通於任督任督病而帶脈始病帶脈者所以約束胞胎之系也帶脈無力則難以提繫必然胎胞不固故曰帶弱則胎易墜帶傷則胎不牢然而帶脈之傷非獨跌閃挫氣已也或行房而放縱或飲酒而顚狂雖無疼痛之苦而有暗耗之害則氣不能化經水而反變爲帶病矣故病帶者惟尼僧寡婦出嫁之女多有之而在室女則少也況加以脾氣之虛肝氣之鬱濕氣之侵熱氣之逼安得不成帶下之病哉故婦人

不調須於調經種子二門參附治之無不見效即如白帶症倘服藥不效其人必經水過則少宜忌迫宜服食帶治行宜類參方見三十三

有終年累月下流白物如涕如唾不能禁止甚則臭穢者所謂白帶也夫白帶乃濕盛而火衰肝鬱而氣弱則脾土受傷濕土之氣下陷是以脾精不守不能化榮血以爲經水反變成白滑之物由陰門直下欲自禁而不可得也治法宜大補脾胃之氣稍佐以舒肝之品使風木不閉塞於地中則地氣自升騰於天上脾氣健而濕氣消自無白帶之患矣方用完帶湯

白朮一兩土炒　山藥一兩炒　人參二錢　白芍五錢酒炒

車前子三錢酒炒　蒼朮三錢製　甘草一錢　陳皮五分

黑芥穗五分　柴胡六分

水煎服二劑輕四劑止六劑則白帶全愈此方脾胃肝三經同治之法寓補於散之中寄消於升之內開

提肝木之氣則肝血不燥何至下尅脾土補益脾土之元則脾氣不濕何難分消水氣至於補脾而兼以補胃者由裏以及表也脾非胃氣之強則脾之弱不能旺是補胃正所以補脾耳

脾土喜燥而惡濕土病濕則木病木必乘之木又爲濕土之氣所侮故肝亦病逍遙散減去當歸妙極

青帶下二

婦人有帶下而色青者甚則綠如菉豆汁稠粘不斷其氣腥臭所謂青帶也夫青帶乃肝經之濕熱肝屬木木色屬青帶下流如菉豆汁明明是肝木之病矣但肝木最喜水潤濕亦水之積似濕非肝木之所惡何以竟成青帶之症不知水爲肝木之所喜而濕實肝木之所惡以濕爲土之氣故也以所惡者合之所喜必有違者矣肝之性既違則肝之氣必逆氣欲上升而濕欲下降兩相牽掣以停住於中焦之間而走於帶脉遂從陰器而出其色青綠者正以其乘肝木之氣化也逆輕者熱必輕而色青逆重者熱必重而色綠似乎治青易而治綠難然而均無所難也解肝木之火利膀胱之水則青綠

之帶病均去矣方用加減逍遙散

茯苓五錢 白芍五錢酒炒 甘草五錢生用 柴胡一錢 茵陳三錢

陳皮一錢 梔子三錢炒

水煎服二劑而色淡四劑而青綠之帶絕不必過劑矣夫逍遙散之立法也乃解肝鬱之藥耳何以治青帶若斯其神與蓋濕熱留於肝經因肝氣之鬱也鬱則必逆逍遙散最能解肝之鬱與逆鬱逆之氣既解則濕熱難留而又益之以茵陳之利濕梔子之清熱肝氣得清而青綠之帶又何自來此方之所以奇而效捷也倘僅以利濕清熱治青帶而置肝氣於不問安有止帶之日哉

汙邪元邪污字未晰擬易以眞水眞火爲濕熱之氣所侵義於任脉云云較無辭病然除齒究不可輕改姑仍之

按丹元指本體而言溼熱即水之不正之氣所以爲邪合成者如淨銀係入鉛銅便不成正色矣眞水眞火與邪混合爲一則

黃帶下 三

婦人有帶下而色黃者宛如黃茶濃汁其氣腥穢所謂黃帶是也夫黃帶乃任脉之濕熱也任脉本不能容水濕氣安得而入而化爲黃帶乎不知帶脉橫生通於任脉任脉直上走於唇齒唇齒之間原有不斷之泉下貫於任脉以化精使任脉無熱氣之繞則口中之津液盡化爲精以入於腎矣惟有熱邪存於下焦之間則津液不能化精而反化濕也夫濕者土之氣實水之侵熱者火之氣實木之生水色本黑火色本紅今濕與熱合欲化紅而不能欲返黑而不得煎熬成汁因變爲黃色矣此乃不從水火之化而從濕化也所以世之人有以黃帶爲脾之濕熱單去治脾而不得痊者是不知眞水眞

不但便矣所以色變原書原無高氣

凡帶症多係脾濕初病無熱但補脾土兼理衝任之氣其病自愈若濕久生熱必得清腎火而濕始有去路方用黃栢車前子妙山藥芡實尤能清熱生津

火合成丹邪元邪繞於任脉胞胎之間而化此黅色也單治脾何能痊乎法宜補任脉之虛而清腎火之炎則庶幾矣方用易黃湯

山藥一兩炒　芡實一兩炒　黃栢二錢鹽水炒　車前子一錢酒炒

白果十枚碎

水煎連服四劑無不全愈此不特治黃帶方也凡有帶病者均可治之而治帶之黃者功更奇也蓋山藥芡實專補任脉之虛又能利水加白果引入任脉之中更為便捷所以奏功之速也至於用黃栢清腎中之火也腎與任脉相通以相濟解腎中之火即解任脉之熱矣

黑帶下四

婦人有帶下而色黑者甚則如黑豆汁其氣亦腥所謂黑帶也夫黑帶者乃火熱之極也或疑火色本紅何以成黑謂爲下寒之極或有之殊不知火極似水乃假象也其症必腹中疼痛小便時如刀刺陰門必發腫面色必發紅日久必黃瘦飲食必兼人口中必熱渴飲以涼水少覺寬快此胃火太旺與命門膀胱三焦之火合而熬煎所以熬乾而變爲炭色斷是火熱之極之變而非少有寒氣也此等之症不至發狂者全賴腎水與肺金無病其生生不息之氣潤心濟胃以救之耳所以但成黑帶之症是火結於下而不炎於上也治法惟以洩火爲主火熱退而濕自除矣方用利火湯

病愈後當節飲食戒辛熱之物調養脾土若捐有此方病幾斷服之傷元氣矣愼之

大黃三錢 白朮土炒五錢 茯苓三錢 車前子酒炒三錢

王不留行三錢 黃連三錢 梔子炒三錢 知母二錢

石膏煅五錢 劉寄奴三錢

水煎服一劑小便疼止而通利二劑黑帶變爲白三劑白亦少減再三劑全愈矣或謂此方過於迅利殊不知火盛之時用不得依違之法譬如救火之焚而少爲遷緩則火勢延燃不盡不止今用黃連石膏梔子知母一派寒涼之品入於大黃之中則迅速掃除而又得王不留行與劉寄奴之利濕甚急則濕與熱俱無停住之機佐白朮以輔土茯苓以滲濕車前以利水則火退水進便成既濟之卦矣

赤帶下 五

婦人有帶下而色紅者似血非血淋瀝不斷所謂赤帶也夫赤帶亦濕病濕是土之氣宜見黃白之色今不見黃白而見赤者火熱故也火色赤故帶下亦赤耳惟是帶脈繫於腰臍之間近乎至陰之地不宜有火而今見火症豈其路通於命門而命門之火出而燒之耶不知帶脈通於腎而腎氣通於肝婦人憂思傷脾又加鬱怒傷肝於是肝經之鬱火內熾下剋脾土脾土不能運化致濕熱之氣蘊於帶脈之間而肝不藏血亦滲於帶脈之內皆由脾氣受傷運化無力濕熱之氣隨氣下陷同血俱下所以似血非血之形象現於其色也其實血與濕不能兩分世人以赤帶屬之心火誤矣治法須清肝

不用參朮若檢妙此症若誤認爲血漏恐其火則成崩用參朮務勞藥治之多不見效亦帶反甚若年逾四九分不將止式頻頭見血此筋疽貴肯分別治之

五帶症古方極多然有驗有不應者總屬未得病原此書揭透

火而扶脾氣則庶幾可愈方用清肝止淋湯

白芍醋炒一兩 當歸酒洗一兩 生地酒炒五錢 阿膠麵炒三錢 白粉丹皮三錢 黃柏二錢 牛膝二錢 香附酒炒一錢 紅棗十個 小黑豆一兩

水煎服一劑少止二劑又少止四劑全愈十劑不再發此方但主補肝之血全不利脾之濕者以赤帶之爲病火重而濕輕也夫火之所以旺者由於血之衰補血即足以制火且水與血合而成赤帶之症竟不能辨其是濕非濕則濕亦盡化而爲血矣所以治血則濕亦除又何必利濕之多事哉此方之妙妙在純於治血少加清火之味故奏功獨奇倘一利其濕反引火下行轉難遽效矣或問曰先生前言助其脾土

病原故所
無不效

之氣今但補其肝木之血何也不知用芍藥以平肝
則肝氣得舒肝氣舒自不克土脾不受尅則脾土自
旺是平肝正所以扶脾耳又何必加人參白朮之品
以致畢事哉

若血崩數日血下數斗六脉俱無鼻中微微有息不可遽服此方恐氣弱虛脫不能受峻補也有

血崩昏暗 六

婦人有一時血崩兩目黑暗昏暈在地不省人事者人莫不謂火盛動血也然此火非實火乃虛火耳世人一見血崩往往用止澁之品雖亦能取效於一時但不用補陰之藥則虛火易於冲擊恐隨止隨發以致經年累月不能全愈者有之是止崩之藥不可獨用必須於補陰之中行止崩之法方用固本止崩湯

大熟地一兩九蒸　白朮一兩土炒焦　黃芪三錢生用　當歸五錢酒洗

黑姜二錢　人參三錢

水煎服一劑崩止十劑不再發倘畏藥味之重而減半則力薄而不能止方妙在全不去止血而惟補血又不止補血而更補氣非惟補氣而更補火蓋血崩

力者用遼人參三錢煎成冲貫黑炭末一錢服之待氣息微旺然後服此方仍加黑黑炭末一錢無不見效無力者用無灰黃酒冲黃末炭末三錢服之待其氣拔補清給可服此方人參以舊參升之照服亦加目眾炭末一錢冲人

而至於黑暗昏暈則血已盡去僅存一線之氣以爲護持若不急補其氣以生血而先補其血而遺氣則有形之血恐不能遽生而無形之氣必且至盡散此所以不先補血而先補氣也然單補氣則血又不易生單補血而不補火則血又必凝滯而不能隨氣而速生況黑薑引血歸經是補中又有收斂之妙所以同補氣補血之藥並用之耳

亦有孀婦年老血崩者必係氣冲血室原方加杭芍炭三錢貫衆炭三錢極效

年老血崩 七

婦人有年老血崩者其症亦與前血崩昏暗者同人以爲老婦之虛耳誰知是不慎房幃之故乎夫婦人至五十歲之外天癸匱乏原宜閉關守寨不宜出陣戰爭苟或適興不過草草了事尚不至腎火大動倘興酣浪戰亦如少年之好合鮮不血室大開崩決而墜矣方用加減當歸補血湯

當歸一兩酒洗　黃芪一兩生用　三七根末三錢　桑葉十四片

水煎服二劑而血少止四劑不再發然必須斷慾始除根若再犯色慾未有不重病者也夫補血湯乃氣血兩補之神劑三七根乃止血之聖藥加入桑葉者所以滋腎之陰又有收斂之妙耳但老婦陰精既虧

用此方以止其暫時之漏實有奇功而不可責其永遠之績者以補精之味倘少也服此四劑後再增入白朮五錢熟地一兩山藥四錢麥冬三錢北五味一錢服百劑則崩漏之根可盡除矣

妊娠宜避房事不避者縱幸不至崩往往墮胎即不墮胎生子亦難養慎之戒之

少婦血崩八

有少婦甫娠三月即便血崩而胎亦隨墮人以為挫閃受傷而致誰知是行房不慎之過哉夫少婦行房亦事之常耳何便血崩蓋因元氣衰弱事難兩顧一經行房洩精則妊娠無所依養遂致崩而且墮凡婦人之氣衰即不耐久戰若貪歡久戰則必洩精太甚氣每不能攝夫血矣況氣弱而又娠再加以久戰內外之氣皆動而血又何能固哉其崩而墮也亦無怪其然也治法自當以補氣為主而少佐以補血之品斯為得之方用固氣湯

人參一兩 白朮五錢土炒 大熟地五錢九蒸 當歸三錢酒洗
白茯苓二錢 甘草一錢 杜仲三錢炒黑 山萸肉二錢蒸

遠志一錢（去心）五味子十粒（炒）

水煎服一劑而血止連服十劑全愈此方固氣而兼補血已去之血可以速生將脫之血可以盡攝凡氣虛而崩漏者此方最可通治非僅治小產之崩其最妙者不去止血而止血之味含於補氣之中也

欲種子者必待洛紅後卽三十時長兩日半也經來之時數足三十時辰便可入房一日男二日女三日男四日女五日男六日女七日男過七日卽不能受孕矣

交感血出九

婦人有一交合則流血不止者雖不至於血崩之甚而終年累月不得愈未免血氣兩傷久則恐有血枯經閉之憂此等之病成於經水正來之時貪歡交合精冲血管也夫精冲血管不過一時之傷精出宜愈何以久而流紅不知血管最嬌嫩斷不可以精傷凡婦人受孕必於血管已淨之時方保無虞倘經水正旺彼欲瀉出而精射之則欲出之血反退而縮入既不能受精而成胎勢必至集精而化血交感之際淫氣觸動其舊日之精則兩相感召舊精欲出而血亦隨之而出治法須通其胞胎之氣引舊日之集精外出而益之以補氣補精之藥則血管之傷可以補完矣方用引精止血湯

人參五錢 白朮一兩土炒 茯苓三錢去皮 熟地一兩九蒸

山萸肉五錢蒸 黑薑一錢 黃柏五分 芥穗三錢

車前子三錢酒炒

水煎連服四劑愈十劑不再發此方用參朮以補氣用地萸以補精精氣既旺則血管流通加入茯苓車前以利水與竅水利則血管亦利又加黃柏爲引直入血管之中而引夙精出於血管之外芥穗引敗血出於血管之內黑薑以止血管之口一方之中實有調停曲折之妙故能袪舊病而除陳疴然必須愼房幃三月破者始不至重傷而補者始不至重損否則不過取目前之效耳其愼之哉宜寡慾

此方入貫仲炭三錢更妙

鬱結血崩十

婦人有懷抱甚鬱口乾舌渴嘔吐呑酸而血下崩者人皆以火治之時而效時而不效其故何也是不識爲肝氣之鬱結也夫肝主藏血氣結而血亦結何以反至崩漏蓋肝之性急氣結則其急更甚更急則血不能藏故崩不免也治法宜以開鬱爲主若徒開其鬱而不知平肝則肝氣大開肝火更熾而血亦不能止矣方用平肝開鬱止血湯

白芍一兩醋炒 白朮一兩土炒 當歸一兩酒洗 丹皮三錢

三七根三錢研末 生地三錢酒炒 甘草二錢 黑芥穗二錢

柴胡一錢

水煎服一劑嘔吐止二劑乾渴除四劑血崩愈方中

妙在白芍之平肝柴胡之開鬱白朮利腰臍則血無積住之虞荊芥通經絡則血有歸還之樂丹皮又清骨髓之熱生地復清臟腑之炎當歸三七於補血之中以行止血之法自然鬱結散而血崩止矣

閃跌血崩十一

婦人有升高墜落或閃挫受傷以致惡血下流有如血崩之狀者若以崩治非徒無益而又害之也蓋此症之狀必手按之而疼痛久之則面色痿黃形容枯槁乃是瘀血作祟並非血崩可比倘不知解瘀而用補澁則瘀血內攻疼無止時反致新血不得生舊血無由化死不能悟豈不可傷哉治法須行血以去瘀活血以止疼則血自止而愈矣方用逐瘀止血湯

生地一兩酒炒　大黃三錢　赤芍三錢　丹皮一錢

當歸尾五錢　枳殼五錢炒　龜版三錢醋炙　桃仁十粒泡炒研

水煎服一劑疼輕二劑疼止三劑血亦全止不必再服矣此方之妙妙於活血之中佐以下滯之品故逐

凡跌打損傷致唾血嘔血皆宜如此治法若血聚胃中宜加川厚樸一錢半姜汁炒

瘀如掃而止血如神或疑跌閃升墜是由外而傷内雖不比内傷之重而旣已血崩則内之所傷亦不爲輕何以只治其瘀而不顧氣也殊不知跌閃升墜非由内傷以及外傷者可比蓋本實不撥去其標病可耳故曰急則治其標

凡血崩症最宜絕慾避房無奈少年人彼此貪歡故服藥往往不效若三月後崩止病愈而房事仍無節制病必復作久則成勞慎之

血海太熱血崩十二

婦人有每行人道經水即來一如血崩人以爲胞胎有傷觸之以動其血也誰知是子宮血海因太熱而不固乎夫子宮即在胞胎之下而血海又在胞胎之上血海者衝脈也衝脈太寒而血即虧衝脈太熱而血即沸血崩之爲病正衝脈之太熱也然既由衝脈之熱則應常崩而無有止時何以行人道而始來果與肝木無恙耶夫脾健則能攝血肝平則能藏血人未入房之時君相二火寂然不動雖衝脈獨熱而血亦不至外馳及有人道之感則子宮大開君相火動以熱招熱同氣相求翕然齊動以鼓其精房血海泛溢有不能止遏之勢肝欲藏之而不能脾欲攝之而不得故經水隨交感而至若

有醫應之捷是惟火之爲病也治法必須滋陰降火以清血海而和子宮則終身之病可半載而除矣然必絕慾三月而後可方用清海丸

大熟地一斤九蒸 山萸十兩蒸 山藥十兩炒 丹皮十兩 北五味二兩炒 麥冬肉十兩 白朮一斤土炒 白芍一斤酒炒 龍骨二兩 地骨皮十兩 乾桑葉一斤 元參一斤 沙參十兩 石斛十兩

右十四味各爲細末合一處煉蜜丸桐子大早晚每服五錢白滾水送下半載全愈此方補陰而無浮動之虛縮血而無寒涼之苦日計不足月計有餘潛移默奪子宮清涼而血海自固倘不揣其本而齊其末徒以髮灰白礬黃連炭五棓子等藥末以外治其幽

隱之處山恐愈濫而愈流終必至於敗亡也可不愼

與

鬼祟之事儒者弗道然城市鄉曲往往有是症不可不察甚勿以此言爲荒唐也

婦人有腹似懷姙終年不產甚至二三年不生者此鬼胎也其人必面色黃瘦肌膚消削腹大如斗厥所由來必素與鬼交或入神廟而興雲雨之思或遊山林而起交感之念皆能召祟成胎幸其人不至淫蕩見祟而有驚惶遇合而生愧惡則鬼祟不能久戀一交媾即遠去然淫妖之氣已結於腹遂成鬼胎其先尚未覺迫後漸漸腹大經水不行內外相色一如懷胎之狀有似血臌之形其實是鬼胎而非臌也治法必須以逐穢爲主然人至懷胎數年不產即非鬼胎亦必氣血衰微況此非眞姙則邪氣必旺正不敵邪其虛弱之狀必有可掬烏可純用迅利之藥以祛蕩乎必於補中逐之爲的也方

用瀉鬼湯

人參一兩 當歸一兩 大黃一兩 雷丸三錢

川牛膝三錢 紅花三錢 丹皮三錢 枳殼一錢

厚樸一錢 小桃仁三十粒

水煎服一劑腹必大鳴可瀉惡物半桶再服一劑又瀉惡物而愈矣斷不可復用三劑也蓋雖補中用逐未免迅利多用恐傷損元氣此方用雷丸以祛穢又得大黃之掃除且佐以厚樸紅花桃仁等味皆善行善攻之品何邪之尚能留腹中而不盡逐下也哉尤妙在用參歸以補氣血則邪去而正不傷若單用雷丸大黃以迅下之必有氣脫血崩之患矣倘或知是鬼胎如室女寡婦輩邪氣雖盛而真氣未漓可用岐

天師新傳紅花霹靂散紅花半斤 大黃五兩 雷丸三兩 水煎服亦能下胎然未免太於迅利過傷氣血不若蕩鬼湯之有益無損爲愈也在人臨症時斟酌而善用之耳

室女鬼胎十四

女子有在家未嫁月經忽斷腹大如妊面色乍赤乍白六脉乍大乍小人以爲血結經閉也誰知是靈鬼憑身乎夫人之身正則諸邪不敢侵其身不正則諸邪自來犯或精神恍惚而夢裏求親或眼目昏花而對面相狎或假托親屬而暗處貪歡或明言仙人而靜地取樂其始則驚詫爲奇遇而不肯告人其後則羞赧爲淫褻而不敢告人日久年深腹大如斗有如懷妊之狀一身之精血僅足以供腹中之邪則邪日旺而正日衰勢必至經閉而血枯後雖欲導其經而邪據其腹則經亦難通欲生其血而邪食其精則血實難長醫以爲胎而實非眞胎又以爲瘕而亦非瘕病往往因循等待非因羞憤

此方陰騭大矣見有因此病甚憤而踏於非命勞瘵而喪於妙年深爲可惆甘服此方不應宜服性香平胃散無不見效愈後宜調養氣血節飲食肉桂去粗皮一錢麝香一錢以上二味

而亡其生即成勞瘵而終不起至死不悟不重可悲哉治法似宜補正以祛邪然邪不先祛補正亦無益也必須先祛邪而後補正斯爲得之方用蕩邪散

雷丸六錢　桃仁六十粒　當歸一兩　丹皮一兩　甘草四錢

水煎服一劑必下惡物半桶再服調正湯治之

白朮五錢　蒼朮五錢　茯苓三錢　陳皮一錢　貝母一錢
薏米五錢

水煎連服四劑則脾胃之氣轉而經水漸行矣前方蕩邪後方補正實有次第或疑身懷鬼胎必大傷其血所以經閉今既墜其鬼胎矣自當大補其血乃不補血而反補胃氣何故蓋鬼胎中人其正氣大虛可知氣虛則血必不能驟生欲補血必先補氣是補氣

共研細末開水爲丸如梧子大空心開水下服後半日時煎平胃散一劑服之蒼术炒三錢厚樸薑汁炒一錢廣皮一錢枳實一錢全當歸三錢川芎一錢酒服後必下惡物若不見下惡物次日再服平胃散不用桂香

而血自然生也用二朮以補胃陽陽氣旺則陰氣難犯尤善後之妙法也倘重用補陰之品則以陰招陰吾恐鬼胎雖下而鬼氣未必不再侵故必以補陽爲上策而血自隨氣而生也

婦科調經尤難蓋經調則無病不調則百病叢生治法宜詳察其病原細審其所以不調之故然後用藥始能見效此書雖有先期後期先後無定期之分然須與種子帶下門參看臨症時自有進境

調經水先期十五

婦人有先期經來者其經甚多人以爲血熱之極也誰知是腎中水火太旺乎夫火太旺則血熱水太旺則血多此有餘之病非不足之症也似宜不藥有喜但過於有餘則子宮太熱亦難受孕更恐有爍乾男精之慮過者損之謂非既濟之道乎然而火不可任其有餘而水斷不可使之不足治之法但少清其熱不必洩其水也

方用清經散

丹皮三錢 地骨皮五錢 白芍三錢酒炒 大熟地三錢九蒸

青蒿二錢 白茯苓一錢 黃柏五分鹽水浸炒

水煎服二劑而火自平此方雖是清火之品然仍是滋水之味火洩而水不與俱洩損而益也

又有先期經來只一二點者人以爲血熱之極也誰知腎中火旺而陰水虧乎夫同是先期之來何以分虛實之異蓋婦人之經最難調苟不分别細微用藥鮮克有效先期者火氣之冲多寡者水氣之驗故先期而來多者火熱而水有餘也先期而來少者火熱而水不足也倘一見先期之來俱以爲有餘之熱但洩火而不補水或水火兩洩之有不更增其病者乎治之法不必洩火只專補水水既足而火自消矣亦既濟之道也方用兩地湯

大生地酒炒一兩 元參一兩 白芍藥酒炒五錢 麥冬肉五錢

地骨皮三錢 阿膠三錢

水煎服四劑而經調矣此方之用地骨生地能清骨

中之熱骨中之熱由於腎經之熱清其骨髓則腎氣自清而又不損傷胃氣此治之巧也況所用諸藥又純是補水之味水盛而火自平理也此條與上條參觀斷無誤治先期之病矣

經水後期十六

婦人有經水後期而來多者人以爲血虛之病也誰知非血虛乎蓋後期之多少實有不同不可執一而論蓋後期而來少血寒而不足後期而來多血寒而有餘夫經本於腎而其流五藏六腑之血皆歸之故經來而諸經之血盡來附益以經水行而門啟不遑迅闔諸經之血乘其隙而皆出也但血既出矣則成不足治法宜於補中溫散之不得曰後期者俱不足也方用溫經攝血湯

大熟地一兩九蒸 白芍一兩酒炒 川芎五錢酒洗 白朮五錢土炒

柴胡五分 五味子三分 肉桂五分去粗研 續斷一錢

水煎服三劑而經調矣此方大補肝腎脾之精與血

加肉桂以祛其寒柴胡以解其鬱是補中有散而散不耗氣補中有洩而洩不損陰所以補之有益而溫之收功此調經之妙藥也而攝血之仙丹也凡經來後期者俱可用倘元氣不足加人參一二錢亦可

以上調經三條辨論明晰立方微妙但恐臨時或有外感內傷不能見效有外感者

經水先後無定期十七

婦人有經來斷續或前或後無定期人以為氣血之虛也誰知是肝氣之鬱結乎夫經水出諸腎而肝為腎之子肝鬱則腎亦鬱矣腎鬱而氣必不宣前後之或斷或續正腎之或通或閉耳或曰肝氣鬱而腎氣不應未必至於如此殊不知子母關切子病而母必有顧復之情肝鬱而腎不無繾綣之誼肝氣之或開或閉即腎氣之或去或留相因而致又何疑焉治法宜舒肝之鬱即開腎之鬱也肝腎之鬱既開而經水自有一定之期矣方用定經湯

菟絲子一兩酒炒 白芍一兩酒炒 當歸一兩酒洗 大熟地五錢九蒸

山藥五錢炒 白茯苓三錢 芥穗二錢炒黑 柴胡五分

宜加蘇葉一錢有內傷者宜加神曲二錢炒有因肉食積滯者再加東山查肉二錢炒臨症須酌用之若肝氣鬱抑又當以逍遙散為主有熱加梔炭丹皮即加味逍遙散

水煎服二劑而經水淨四劑而經期定矣此方舒肝腎之氣非通經之藥也補肝腎之精非利水之品也肝腎之氣舒而精通肝腎之精旺而水利不治之治正妙於治也

嘗見婦人一年一行經身健無恙妊娠後反月月俱行經或至五月至七月經止不等育男皆成人成以

經水數月一行十八

婦人有數月一行經者每以爲常亦無或先或後之異亦無或多或少之殊人莫不以爲異而不知非異也蓋無病之人氣血兩不虧損耳夫氣血既不虧損何以數月而一行經也婦人之中亦有天生仙骨者經水必一季一行蓋以季爲數而不以月爲盈虛也眞氣內藏則坎中之眞陽不損倘加以煉形之法一年之內便易飛騰無如世人不知見經水不應月來誤認爲病妄用藥餌本無病而治之成病是治反不如其不治也山聞異人之教特爲闡揚使世人見此等行經不必妄行治療萬勿疑爲氣血之不足而輕一試也雖然天生仙骨之婦人世固不少而嗜慾損夭之人亦復甚多又不可不

為異或亦仙骨之所致乎亦造化令人不測耶

立一療救之方以輔之方名助仙丹

白茯苓五錢　陳皮五錢　白朮土炒三錢　白芍酒炒三錢

山藥炒三錢　菟絲子酒炒二錢　杜仲炒黑一錢　甘草一錢

河水煎服四劑而仍如其舊不可再服也此方平補之中實有妙理健脾益腎而不滯解鬱清痰而不洩不損天然之氣血便是調經之大法何得用他藥以變亂經哉

加貫仲炭一錢研細末以藥冲服尤妙

年老經水復行十九

婦人有年五十外或六七十歲忽然行經者或下紫血塊或如紅血淋人或謂老婦行經是還少之象誰知是血崩之漸乎夫婦人至七七之外天癸已竭又不服濟陰補陽之藥如何能精滿化經一如少婦然經不宜行而行者乃肝不藏脾不統之故也非精過泄而動命門之火即氣鬱甚而發龍雷之炎二火交發而血乃奔矣有似行經而實非經也此等之症非大補肝脾之氣與血而血安能驟止方用安老湯

人參一兩 黃芪生用一兩 大熟地九蒸一兩 白朮土炒五錢
當歸酒洗五錢 山萸蒸五錢 阿膠蛤粉炒一錢 黑芥穗一錢
甘草一錢 香附酒炒五分 木耳炭一錢

水煎服一劑減二劑尤減四劑全減十劑愈此方補益肝脾之氣氣足自能生血而攝血尤妙大補腎水水足而肝氣自舒肝舒而脾自得養肝藏之而脾統之又安有洩漏者又何慮其血崩哉

經水忽來忽斷時疼時止二十

婦人有經水忽來忽斷時疼時止寒熱往來者人以爲血之凝也誰知是肝氣不舒乎夫肝屬木而藏血最惡風寒婦人當行經之際腠理大開適逢風之吹寒之襲則肝氣爲之閉塞而經水之道路亦隨之而俱閉由是腠理經絡各皆不宣而寒熱之作由是而起其氣行於陽分則生熱其氣行於陰分則生寒然此猶感之輕者也倘外感之風寒更甚則內應之熱氣益深往往有熱入血室而變爲如狂之症一似遇鬼之狀者若但往來寒熱是風寒未甚而熱未深耳治法宜補肝中之血通其鬱而散其風則病隨手而效所謂治風先治血血和風自滅此其一也方用加味四物湯

加荆芥穗炒黑一錢尤妙

大熟地一兩九蒸 白芍五錢酒炒 當歸五錢酒洗 川芎三錢酒洗
白术五錢土炒 粉丹皮三錢 元胡一錢酒炒 甘草一錢
柴胡一錢

水煎服此方用四物以滋脾胃之陰血用柴胡白芍丹皮以宣肝經之風鬱用甘草白术元胡以利腰臍而和腹疼入於表裏之間通乎經絡之內用之得宜自奏功如響也

經水未來腹先疼二十一

婦人有經前腹疼數日而後經水行者其經來多是紫黑塊人以爲寒極而然也誰知是熱極而火不化乎夫肝屬木其中有火舒則通暢鬱則不揚經欲行而肝不應則抑拂其氣而疼生然經滿則不能內藏而肝中之鬱火焚燒內逼經出則其火亦因之而怒洩其紫黑者水火兩戰之象也其成塊者火煎成形之狀也經先其爲經者正鬱火內奪其權耳治法似宜大洩肝中之火然洩肝之火而不解肝之鬱則熱之標可去而熱之本未除也其何能益方用宣鬱通經湯

白芍五錢酒炒 當歸五錢酒洗 丹皮五錢 山梔子三錢炒

白芥子二錢炒研 柴胡一錢 香附一錢酒炒 川鬱金一錢醋炒

黄芩酒炒一錢 生甘草一錢

水煎連服四劑下月斷不先腹疼而後行經矣此方補肝之血而解肝之鬱利肝之氣而降肝之火所以奏功之速

經前經後腹痛二方極妙不可加減若有別症亦宜此方爲主另加藥味治之原方

行經後少腹疼痛二十二

婦人有少腹疼於行經之後者人以爲氣血之虛也誰知是腎氣之涸乎夫經水者乃天一之眞水也滿則溢而虛則閉亦其常耳何以虛能作疼哉蓋腎水一虛則水不能生木而肝木必尅脾土木土相爭則氣必逆故爾作疼治法必須以舒肝氣爲主而益之以補腎之味則水足而肝氣益安肝氣安而逆氣自順又何疼痛之有哉方用調肝湯

山藥五錢炒　阿膠三錢白麪炒　當歸三錢酒洗　白芍三錢酒炒

山萸肉三錢蒸熟　巴戟一錢鹽水浸　甘草一錢

水煎服此方平調肝氣既能轉逆氣又善止鬱疼經後之症以此方調理最佳不特治經後腹疼之症也

經前腹痛吐血二十三

婦人有經未行之前一二日忽然腹疼而吐血人以爲火熱之極也誰知是肝氣之逆乎夫肝之性最急宜順而不宜逆順則氣安逆則氣動血隨氣爲行止氣安則血安氣動則血動亦勿怪其然也或謂經逆在腎不在肝何以隨血妄行竟至從口上出也是肝不藏血之故乎抑腎不納氣而然乎殊不知少陰之火急如奔馬得肝火直沖而上其勢最捷反經而爲血亦至便也正不必肝不藏血始成吐血之症但此等吐血與各經之吐血有不同者蓋各經之吐血由內傷而成經逆而吐血乃內溢而激之使然也其症有絕異而其氣逆則一也治法似宜平肝以順氣而不必益精以補腎矣雖然經

逆而吐血雖不大損夫血而反覆顛倒未免太傷腎氣必須於補腎之中用順氣之法始爲得當方用順經湯

當歸（酒洗五錢）大熟地（九蒸五錢）白芍（酒炒二錢）丹皮（五錢）

白茯苓（三錢）沙參（三錢）黑芥穗（三錢）

水煎服一劑而吐血止二劑而經順十劑不再發此方於補腎調經之中而用引血歸經之品是和血之法實寓順氣之法也肝不逆而腎氣自順腎氣既順又何經逆之有哉

衝任之氣宜通不宜降故化濕

經水將來臍下先疼痛二十四

婦人有經水將來三五日前而臍下作疼狀如刀刺者或寒熱交作所下如黑豆汁人莫不以爲血熱之極誰知是下焦寒濕相爭之故乎夫寒濕乃邪氣也婦人有衝任之脉居於下焦衝爲血海任主胞胎爲血室均喜正氣相通最惡邪氣相犯經水由二經而外出而寒濕滿二經而內亂兩相爭而作疼痛邪愈盛而正氣日衰寒氣生濁而下如豆汁之黑者見北方寒水之象也治法利其濕而溫其寒使衝任無邪氣之亂臍下自無疼痛之疚矣方用溫臍化濕湯

白朮一兩土炒 白茯苓三錢 山藥五錢炒 巴戟肉五錢鹽水浸

扁豆三錢炒搗 白果十枚搗碎 建蓮子三十枚不去心

不用蒼朮薏仁餘甘類參

水煎服然必須經未來前十日服之四劑而邪氣去經水調兼可種子此方君白朮以利腰臍之氣用巴戟白菓以通任脉扁豆山藥蓮子以衛衝脉所以寒濕掃除而經水自調可受妊矣倘疑腹疼爲熱疾妄用寒涼則衝任虛冷血海變爲冰海血室反成冰室無論難於生育而疼痛之止又安有日哉

經水過多二十五

婦人有經水過多行後復行面色痿黃身體倦怠而困之愈甚者人以爲血熱有餘之故誰知是血虛而不歸經乎夫血旺始經多血虛當經縮今曰血虛而反經多是何言與殊不知血歸於經雖旺而經亦不多血不歸經雖衰而經亦不少世之人見經水過多謂是血之旺也此治之所以多錯耳倘經多果是血旺自是健壯之體須當一行即止精力如常何至一行後而再行而困之無力耶惟經多是血之虛故再行而不勝其困乏之血損精散骨中髓空所以不能色華於面也治法宜大補血而引之歸經又安有行後復行之病哉方用加減四物湯

荊芥穗炭能引血歸經方妙極不可輕易加減

大熟地一兩九蒸 白芍三錢酒炒 當歸五錢酒洗 川芎二錢酒洗
白朮五錢土炒 黑芥穗三錢 山萸三錢蒸 續斷一錢
甘草一錢

水煎服四劑而血歸經矣十劑之後加人參三錢再服十劑下月行經適可而止矣夫四物湯乃補血之神品加白朮荊芥補中有利加山萸續斷止中有行加甘草以調和諸品使之各得其宜所以血足而歸經歸經而血自靜矣

與胖人不孕參看自傳立方之妙

經前洩水 二十六

婦人有經未來之前洩水三日而後行經者人以為血旺之故誰知是脾氣之虛乎夫脾統血脾虛則不能攝血矣且脾屬濕土脾虛則土不實土不實而濕更甚所以經水將動而脾先不固脾經所統之血欲流注於血海而濕氣乘之所以先洩水而後行經也調經之法不在先治其水而在先治其血抑不在先治其血而在先補其氣蓋氣旺而血自能生抑氣旺而濕自能除且氣旺而經自能調矣方用健固湯

人參五錢 白茯苓三錢 白朮土炒一兩 巴戟鹽水浸五錢

薏苡仁炒三錢

水煎連服十劑經前不洩水矣此方補脾氣以固脾

血則血攝於氣之中脾氣日盛自能運化其濕濕既化爲烏有自然經水調和又何至經前泄水哉

若大便下血過多精神短少人愈消瘦必係肝氣不舒久鬱傷脾脾傷不能統血又當分別治之方用補血湯嫩黃芪二

經前大便下血二十七

婦人有行經之前一日大便先出血者人以為血崩之症誰知是經流於大腸乎夫大腸與行經之路各有分別何以能入乎其中不知胞胎之系上通心而下通腎心腎不交則胞胎之血兩無所歸而心腎二經之氣不來照攝聽其自便所以血不走小腸而走大腸也治法若單止大腸之血則愈止而愈多若擊動三焦之氣則更拂亂而不可止蓋經水之妄行原因心腎之不交今不使水火之既濟而徒治其胞胎則胞胎之氣無所歸而血安有歸經之日故必大補其心與腎使心腎之氣交而胞胎之氣自不散則大腸之血自不妄行而經自順矣方用順經兩安湯

牛膝 荊芥 歸身酒洗 炒 杭白芍炭 白朮炭二錢 杜仲炒黑 續斷 荊芥炭 炙炭錢 引用貫仲炭一錢冲入服之四劑必獲愈愈後減半再服二劑經入大腸必當行經之際而大使下血也初病血雖錯行精神必照常若無不統血

當歸五錢酒洗　白芍五錢酒炒　大熟地五錢九蒸　山萸肉二錢蒸

人參三錢　白朮五錢土炒　麥冬五錢去心　黑芥穗二錢

巴戟肉一錢鹽水浸　升麻四分

水煎服二劑大腸血止而經從前陰出矣三劑經止而兼可受妊矣此方乃大補心肝腎三經之藥全不去顧胞胎而胞胎有所歸者以心腎之氣交也蓋心腎虛則其氣兩分心腎足則其氣兩合心與腎不離而胞胎之氣聽命於二經之攝又安有妄動之形哉然則心腎不交補心腎可也又何兼補夫肝木耶不知肝乃腎之子心之母也補肝則肝氣往來於心腎之間自然上引心而下入於腎下引腎而上入於心不啻介紹之助也此使心腎相交之一大法門不特

精神卽不能照常矣用新術之

調經而然也學者其深思諸

年未老經水斷二十八

經云女子七七而天癸絕有年未至七七而經水先斷者人以爲血枯經閉也誰知是心肝脾之氣鬱乎使其血枯安能久延於人世醫見其經水不行妄謂之血枯耳其實非血之枯乃經之閉也且經原非血也乃天一之水出自腎中是至陰之精而有至陽之氣故其色赤紅似血而實非血所以謂之天癸世人以經爲血此千古之誤牢不可破倘果是血何不名之曰血水而曰經水乎古昔聖賢創呼經水之名者原以水出於腎乃癸干之化故以名之無如世人沿襲而不深思其旨皆以血視之然則經水早斷似乎腎水衰涸吾以爲心肝脾氣之鬱者蓋以腎水之生原不由於心肝脾而腎水之

善醫者祇用衆前純和之品而大病盡除

化實有關於心肝脾使水位之下無土氣以承之則水濫滅火腎氣不能化火位之下無水氣以承之則火炎鑠金腎氣無所生木位之下無金氣以承之則木妄破土腎氣無以成倘心肝脾有一經之鬱則其氣不能入於腎中腎之氣即鬱而不宣矣況心肝脾俱鬱即腎氣眞足而無虧尚有茹而難吐之勢矧腎氣本虛又何能盈滿而化經水外洩耶經曰亢則害此之謂也此經之所以閉塞有似乎血枯而實非血枯耳治法必須散心肝脾之鬱而大補其腎水仍大補其心肝脾之氣則精溢而經水自通矣方用益經湯

大熟地一兩九蒸　白朮一兩土炒　山藥五錢炒　當歸五錢酒洗

白芍三錢酒炒　生棗仁三錢搗碎　丹皮二錢　沙參三錢

不調醫者立異矜奇不惟無效反致百病遂生凡用藥雜亂假金石爲上品者戒之戒之

柴胡一錢　杜仲炒黑一錢　人參二錢

水煎連服八劑而經通矣服三十劑而經不再閉兼可受孕此方心肝脾腎四經同治藥也妙在補以通之散以開之倘徒補則鬱不開而生火徒散則氣益衰而耗精設或用攻堅之劑辛熱之品則非徒無益而又害之矣

身瘦不孕二十九

婦人有瘦怯身軀久不孕育一交男子即卧病終朝人以為氣虛之故誰知是血虛之故乎或謂血藏於肝精涵於腎交感乃洩腎之精與血虛何與殊不知肝氣不開則精不能洩腎精既洩則肝氣亦不能舒以腎為肝之母母既洩精不能分潤以養其子則木燥乏水而火且暗動以鑠精則腎愈虛矣況瘦人多火而又洩其精則水益少而火益熾水雖制火而腎精空乏無力以濟成火在水上之卦所以倦怠而卧也此等之婦偏易動火然此火因貪慾而出於肝木之中又是虛燥之火絕非真火也且不交合則已交合又偏易走洩此陰虛火旺不能受孕即偶爾受孕必致逼乾男子之精隨種而

服藥三月後不受孕仍照原方加杜仲炒斷絲續斷二錢白朮土炒焦五錢雲苓三錢服數劑後必受孕

隨消者有之治法必須大補腎水而平肝木水旺則血旺血旺則火消便成水在火上之卦方用養精種玉湯

大熟地九蒸一兩 當歸酒洗五錢 白芍酒炒五錢 山萸肉蒸熟五錢

水煎服三月便可身健受孕斷可種子此方之用不特補血而純於塡精精滿則子宮易於攝精血足則子宮易於容物皆有子之道也惟是貪慾者多節慾者少往往不驗服此者果能節慾三月心靜神清自無不孕之理否則不過身體壯健而已勿咎方之不靈也

胸滿不孕人每誤爲脾胃虛甚不能尅食用扶脾消導之藥腎

胸滿不思食不孕 三十

婦人有飲食少思胸膈滿悶終日倦怠思睡一經房事呻吟不已人以爲脾胃之氣虛也誰知是腎氣不足乎夫氣宜升騰不宜消降升騰於上焦則脾胃易於分運降陷於下焦則脾胃難於運化人之水穀之養則精神自爾倦怠脾胃之氣可升而不可降也明甚然則脾胃之氣雖充於脾胃之中實生於兩腎之內無腎中之水氣則胃之氣不能騰無腎中之火氣則脾之氣不能化惟有腎之水火二氣而脾胃之氣始能升騰而不降也然則補脾胃之氣可不急補腎中水火之氣乎治法必以補腎氣爲主但補腎而不兼補脾胃之品則腎之水火二氣不能提於至陽之上也方用并提湯

氣怯雖何能受孕妙在立方不峻補腎火所以不用桂附等藥但專補腎氣使脾胃之氣不復下陷則帶脈氣充胞胎氣旺自然受孕無難矣

大熟地一兩九蒸 巴戟一兩鹽水浸 白朮土炒一兩 人參五錢
黃芪生用五錢 山萸肉蒸三錢 枸杞二錢 柴胡五分
水煎服三月而腎氣大旺再服一月未有不能受孕
者此方補氣之藥多於補精似乎以補脾胃為主矣
孰知脾胃健而生精自易是補脾胃之氣與血正所
以補腎之精與水也又益以補精之味則陰氣自足
陽氣易升自爾騰越於上焦矣陽氣不下陷則無非
大地陽春隨遇皆是化生之機安有不受孕之理與

下部冰冷不受孕三十

婦人有下身冰冷非火不煖交感之際陰中絕無溫熱之氣人以為天分之薄也誰知是胞胎寒之極乎夫寒冰之地不生草木重陰之淵不長魚龍今胞胎既寒何能受孕雖男子鼓勇力戰其精甚熱直射於子宮之內而寒冰之氣相逼亦不過茹之於暫而不能不吐之於久也夫猶是人也此婦之胞胎何以寒涼至此豈非天分之薄乎非也蓋胞胎居於心腎之間上繫於心而下繫於腎胞胎之寒涼乃心腎二火之衰微也故治胞胎者必須補心腎二火而後可方用溫胞飲

白朮一兩土炒 巴戟一兩鹽水浸 人參三錢 杜仲三錢炒黑

菟絲子三錢酒浸炒 山藥三錢炒 芡實三錢炒 肉桂二錢去粗研

今之種子者多喜服熱藥不知此方特爲胞胎寒者設若胞胎有熱則不宜服審之

附子製二分 補骨脂鹽水炒一錢

水煎服一月而胞胎熱此方之妙補心而即補腎溫腎而即溫心心腎之氣旺則心腎之火自生心腎之火生則胞胎之寒自散原因胞胎之寒以至茹而即吐而今胞胎既熱矣尚有施而不受者乎若改湯爲丸朝夕吞服尤能攝精斷不至有伯道無兒之歎也

少食不孕
與胸滿不
思飲食有
間一補腎

胸滿少食不孕二十二

婦人有素性恬淡飲食少則平和多則難受或作嘔洩胸膈脹滿久不受孕人以為賦稟之薄也誰知是脾胃虛寒乎夫脾胃之虛寒原因心腎之虛寒耳蓋胃土非心火不能生脾土非腎火不能化心腎之火衰則脾胃失生化之權即不能消水穀以化精微矣既不能化水穀之精微自無津液以灌溉於胞胎之中欲胞胎有溫煖之氣以養胚胎必不可得縱然受胎而帶脈無力亦必墮落此脾胃虛寒之咎故無玉麟之毓也治法可不急溫補其脾胃乎然脾之母原在腎之命門胃之母原在心之包絡欲溫補脾胃必須補二經之火蓋母旺子必不弱母熱子必不寒此子病治母之義也方用溫土

中之氣一補命門與心包絡之火藥味不多其君臣佐使之妙宜細參之

毓麟湯

巴戟一兩去心酒浸　覆盆子一兩酒浸蒸　白朮五錢土炒　人參三錢

懷山藥五錢炒　神麯一錢炒

水煎服一月可以種子矣此方之妙溫補脾胃而又兼補命門與心包絡之火藥味不多而四經並治命門心包之火旺則脾與胃無寒冷之虞子母相顧一家和合自然飲食多而善化氣血旺而能任帶脉有力不虞落胎安有不玉麟之育哉

凡種子治法不出帶脈胞胎二經數言已洩造化之秘矣

少腹急迫不孕 三十三

婦人有少腹之間自覺有緊迫之狀急而不舒不能生育此人人之所不識也誰知是帶脈之拘急乎夫帶脈繫於腰臍之間宜弛而不宜急今帶脈之急者由於腰臍之氣不利也而腰臍之氣不利者由於脾胃之氣不足也脾胃氣虛則腰臍之氣閉腰臍之氣閉則帶脈拘急遂致牽動胞胎精即直射於胞胎胞胎亦暫能茹納而力難負載必不能免小產之虞況人多不能節慾安得保其不墜乎此帶脈之急所以不能生子也治法宜寬其帶脈之急而帶脈之急不能遽寬也宜利其腰臍之氣而腰臍之氣不能遽利也必須大補其脾胃之氣與血而腰臍可利帶脈可寬自不難於孕育矣方用寬

帶湯

白朮一兩土炒　巴戟肉五錢酒浸　補骨脂一錢鹽水炒　人參三錢

麥冬三錢去心　杜仲三錢炒黑　大熟地五錢九蒸　肉蓯蓉三錢洗淨

白芍三錢酒炒　當歸二錢酒洗　五味三分炒　建蓮子二十粒不去心

水煎服四劑少腹無緊迫之狀服一月即受胎此方之妙脾胃兩補而又利其腰臍之氣自然帶脈寬舒可以載物而勝任矣或疑方中用五味白芍之酸收不增帶脈之急而反得帶脈之寬殊不可解豈知帶脈之急由於氣血之虛蓋血虛則縮而不伸氣虛則攣而不達用芍藥之酸以平肝木則肝不尅脾用五味之酸以生腎水則腎能益帶似相妨而實相濟也何疑之有

方似平平無奇然知能解始信子不可忽

嫉妒不孕三十四

婦人有懷抱素惡不能生子者人以爲天心厭之也誰知是肝氣鬱結乎夫婦人之有子也必然心脈流利而滑脾脈舒徐而和腎脈旺大而鼓指始稱喜脈未有三部脈鬱而能生子者也若三部脈鬱肝氣必因之而更鬱肝氣鬱則心腎之脈必致鬱之極而莫解蓋子母相依鬱必不喜喜必不鬱也其鬱而不能成胎者以肝木不舒必下尅脾土而致塞脾土之氣塞則腰臍之氣必不利腰臍之氣不利必不能通任脈而達帶脈則帶脈之氣亦塞矣帶脈之氣既塞則胞胎之門必閉精即到門亦不得其門而入矣其奈之何哉治法必解四經之鬱以開胞胎之門則幾矣方用開鬱種玉湯

覌若懷忿而仍然嫉妬必致血鬱墮胎館幸不隨胎生子多不能成方加解妬飲合煎之可保無慮必須嬰其性情始效

解妬飲

黍穀各格械參脌小黑豆各四十九粒豆炒熟高粱五十五粒

白芍一兩酒炒　香附三錢酒炒　當歸五錢酒洗　白朮五錢土炒

丹皮三錢酒洗　茯苓三錢去皮　花粉二錢

水煎服一月則鬱結之氣開鬱開則無非喜氣之盈腹而嫉妬之心亦可以一易自然兩相合好結胎於頃刻之間矣此方之妙解肝氣之鬱宣脾氣之困而心腎之氣亦因之俱舒所以腰臍利而任帶通達不必啟胞胎之門而胞胎自啟不特治嫉妬者也

肥胖不孕三十五

婦人有身體肥胖痰涎甚多不能受孕者人以為氣虛之故誰知是濕盛之故乎夫濕從下受乃言外邪之濕也而肥胖之濕實非外邪乃脾土之內病也然脾土既病不能分化水穀以養四肢宜其身軀瘦弱何以能肥胖乎不知濕盛者多肥胖肥胖者多氣虛氣虛者多痰涎外似健壯而內實虛損也內虛則氣必衰氣衰則不能行水而濕停於腸胃之間不能化精而化涎矣夫脾本濕土又因痰多愈加其濕脾不能受必浸潤於胞胎日積月累則胞胎竟變為汪洋之水窟矣且肥胖之婦內肉必滿遮隔子宮不能受精此必然之勢也況又加以水濕之盛即男子甚健陽精直達子宮而其水勢滔

再十劑後方加杜仲一錢半炒[illegible][illegible]續斷錢半炒必受孕矣

滔泛濫可畏亦遂化精成水矣又何能成妊哉治法必須以洩水化痰爲主然徒洩水化痰而不急補脾胃之氣則陽氣不旺濕痰不去人先病矣烏望其茹而不吐乎方用加味補中益氣湯

人參三錢 黃芪三錢生用 柴胡一錢 甘草一錢 當歸三錢酒洗

白朮一兩土炒 升麻四分 陳皮五分 茯苓五錢 半夏三錢製

水煎服八劑痰涎盡消再十劑水濕利子宮涸出易於受精而成孕矣其在於昔則如望洋觀海而至於今則是馬到成功也快哉此方之妙妙在提脾氣而升於上作雲作雨則水濕反利於下行助胃氣而消於下爲津爲液則痰涎轉易於上化不必用消化之品以損其肥而肥自無礙不必用浚決之味以開其

竅而竅自能通陽氣充足自能攝精濕邪散除自可
受種何肥胖不孕之足慮乎

骨蒸夜熱不孕 三十六

婦人有骨蒸夜熱遍體火焦口乾舌燥咳嗽吐沫難於生子者人以爲陰虛火動也誰知是骨髓內熱乎夫寒陰之地固不生物而乾旱之田豈能長養然而骨髓與胞胎何相關切而骨髓之熱即能使人不嗣此前賢所未言者也山一旦創言之不幾爲世俗所駭乎而要知不必駭也此中實有其理焉蓋胞胎爲五臟外之一臟耳以其不陰不陽所以不列於五臟之中所謂不陰不陽者以胞胎上繫於心包下繫於命門繫心包者通於心心者陽也繫命門者通於腎腎者陰也是陰之中有陽陽之中有陰所以通於變化或生男或生女俱從此出然必陰陽協和不偏不枯始能變化生人否則否矣

治骨髓熱所以不用熱地方極善用者萬勿加減凡服藥病去七分即止不必拘泥三十劑六十劑之數三元生人不一類推除

況胞胎既通於腎而骨髓亦腎之所化也骨髓熱由於腎之熱腎熱而胞胎亦不能不熱且胞胎非骨髓之養則嬰兒無以生骨骨髓過熱則骨中空虛惟存火烈之氣又何能成胎治法必須清骨中之熱然骨熱由於水虧必補腎之陰則骨熱除珠露有滴濡之喜矣壯水之主以制陽光此之謂也方用清骨滋腎湯

地骨皮一兩酒洗 丹皮五錢 沙參五錢 麥冬五錢去心
元參五錢酒洗 五味子五分炒研 白朮三錢土炒 石斛二錢

水煎連服三十劑而骨熱解再服六十劑自受孕此方之妙補腎中之精涼骨中之熱不清胞胎而胞胎自無太熱之患然陰虛內熱之人原易受妊今因骨髓過熱所以受精而變燥以致難於育子本非胞胎

之不能受精所以稍補其腎以殺其火之有餘而益其水之不足便易種子耳

此方為有癥瘕而設故用沙參荸薺粉鱉

腰酸腹脹不孕三十七

婦人有腰酸背楚胸滿腹脹倦怠欲卧百計求嗣不能如願人以為腰腎之虛也誰知是任督之困乎夫任脈行於前督脈行於後然皆從帶脈之上下而行也故任脈虛則帶脈墜於前督脈虛則帶脈墜於後雖胞胎受精亦必小產況任督之脈既虛而癥瘕之症必起癥瘕碍胞胎而外障則胞胎縮於癥瘕之內往往精施而不能受雖餌以玉燕亦何益哉治法必須先去其癥瘕之病而補其任督之脈則提挈天地把握陰陽呼吸精氣包裹成形力足以勝任而無虞矣外無所障內有所容安有不能生育之理方用升帶湯

白朮一兩土炒 人參三錢 沙參五錢 肉桂一錢去粗研

甲以破堅理氣若無痂瘕去此三味加杜仲炒一錢半澤瀉一錢半甘枸杞炒三味服之腰酸腹脹自除矣鱉甲破氣不可誤服惟有痂瘕與木鬱者宜之

荸薺粉三錢　鱉甲炒三錢　茯苓三錢　半夏製一錢
神麯炒一錢

水煎連服三十劑而任督之氣旺再服三十劑而痂瘕之症除此方利腰臍之氣正升補任督之氣也任督之氣升而痂瘕自有難容之勢況方中有肉桂以散寒荸薺以袪積鱉甲之攻堅茯苓之利濕有形自化於無形滿腹皆升騰之氣矣何至受精而再墜乎哉

便澁腹脹足浮肺此症極多不惟不能受孕抑且漸添雜症久

便澁腹脹足浮腫不孕 三十八

婦人有小水艱澁腹脹脚腫不能受孕者人以為小腸之熱也誰知是膀胱之氣不化乎夫膀胱原與胞胎相近膀胱病而胞胎亦病矣蓋水濕之氣必走膀胱而膀胱不能自化必得腎氣相通始能化水以出陰器倘膀胱無腎氣之通則膀胱之氣化不行水濕之氣必且滲入胞胎之中而成汪洋之勢汪洋之田又何能生物也哉治法必須壯腎氣以分消胞胎之濕益腎火以達化膀胱之水使先天之本壯則膀胱之氣化胞胎之濕除而汪洋之田化成雨露之壤矣水化則膀胱利火旺則胞胎煖安有布種而不發生者哉方用化水種子湯

巴戟一兩鹽水浸 白朮一兩土炒 茯苓五錢 人參三錢

而不愈甚有成方療不治者此方補水而不助濕補火而使歸原方極不可加減一味若無好肉桂以破故紙一錢代之用核桃仁二錢連皮燒黑去皮用仁作引若用好肉桂即可不用核桃引

兔絲子酒炒五錢 芡實炒五錢 車前酒炒二錢 肉桂去粗研一錢

水煎服二劑膀胱之氣化四劑艱澁之症除又十劑虛脹脚腫之病形消再服六十劑腎氣大旺胞胎溫煖易於受胎而生育矣此方利膀胱之水全在補腎中之氣煖胞胎之氣全在壯腎中之火至於補腎之藥多是濡潤之品不以濕而益助其濕乎然方中之藥妙於補腎之火而非補腎之水尤妙於補火而無燥烈之虞利水而非蕩滌之猛所以膀胱氣化胞胎不濕而發榮長養無窮與

女科上卷終

女科下卷目錄共三十九條四十一症四十二方二法

正產

產後